

אקנה, לא רק למתבגרים

על הגורמים ושיטות הטיפול היעילות באקנה
המוחיע אצל צעירים מתבגרים ומבוגרים



ד"ר מירי לוש Ph.D. MBA

אך מה ניתן לעשות?

- לאחר ואקנה יכול להשתטט במקומות רכבות, הטיפול באקנה צריך להיות מותאם לשוג האקנה ולמלל אחת או יותר מהיששות הטיפוסלית הבאות:
- הפחתת יצור חלב - באמצעות חומרים המאזנים את יצור החלב.
- מינית העצמות החלב ייחד עם תא שור בתוך הנקבובית - באמצעות קילוף (פילוגן) שוטף פפי השור ויקו عمוק של הנקבובית.
- קטילת חיידי *P. acnes* – המותרים בזקיק השער – באמצעות חומרים אטטי-בקטריאליים.
- הריגעת הדלקת הנגרמת כתוצאה מההתרבויות החיידקים – באמצעות חומרים מרגניים ונטמי-ללקטיים.

**רוב מקרי האקנה יתאים לאחת
משלוש הקטגוריות הבאות,
המודוגנות לפי דוגות חומרה שונות
בהתאם לתמונה הקליעית:**

- אקנה קומודגניקה (Comedonal acne) – נחشب לשוג הקל של האקנה.
- הגורם: סתיית הנקבוביות בעור כתוצאה מהעצברות חלב ייחד עם תא שור העור התוצאה: אקנה קומודגניקה מותבטא על פני העור בצורה של קומודונים שחורים ו/או לבנים. אקנה מסווג זה נתה להופיע בתדירות גבוהה על המצח, האף והסנטר.
- הטיפול: הטיפול באקנה קומודגניקה יתמקד בעיקר בכיצוע פשלות אשר יאטם את רמת יצור החלב וימנעו את העצברות של בעור הנקבובית המובילת לסתימה.
- אקנה דלקתי (Inflammatory acne) – נחشب לאקנה מודרגנה בונפת.
- הגורם: צורה זו של אקנה מותהשת כאשר בתוך הנקבוביות החסומה, חיידי *P. acnes* מותרים ו/or מרכיבים לדלקת.
- התוצאה: כתוצאה מהדלקת הקומודונים השחורים והלבנים הופכים לפצעים אדומים, מודרגנים. וכאבים.

חטפת נפוצה (*Acne vulgaris*) הינה בעיה עור שכילה אצל מתבגרים והשיכחות שלה גבולה גם בקרב מבוגרים. לмотת שאין גיל בחר המפheid בין אקנה המוחיע אצל צעירים מתבגרים לאקנה אצל מבוגרים, מזΚובל לאבחן אקנה המוחיע אצל מטופלים מעל גיל 25 לפחות של מבוגרים. אקנה של מבוגרים יכול להיות המשך של האקנה מגיל ההתבגרות או התרחשות חדשה אצל מטופלים שלא סבלו מאקנה בגיל ההתבגרות.


(הפרשה שמנית) הגורם לסתייה של הנקבוביות בשור, אשר עללה להוביל להתקפות חידושים ובמהמשך לדלקת.

חשוב לציין שאוامر הסיבות לאקנה יכולות להיות דומות אצל מטופלים נשים, אך העור שלם בגיל 13 מואוד שווה מהעור שלם בגיל 30. ככל שאם מטופרים, העור שלם יותר לדק יותר ורגע של חומרים. ישנו תכשירים המכילים חומרים פעילים מוגרים, להגמא: 10% בנזאל פרוטקסיד או 2%

51% מהנשים ו-42% מהגברים בגילאי 20-29, 35% מהנשים ו-20% מהגברים בגילאי 30-39, 26% מהנשים ו-12% מהגברים בגילאי 40-49.

קיים מספר תוריזם לאקנה שהמקורה של רוכם טוון בנטיקקה או תירה ירשם, לחוגמא: היפשות יתר להורמוניים, פגם גנטי מבנה ללולנת השוען, התתקנות יתר וריגושים לחומרים כימיים או פיזיקאים עילים שנבר מטבגר בגיל 13, אך גברים מידי עבר מטופל נ-30, וכפותה נמוך. עלולים לגרום לתגובה היפה ולהחמיר את מצב האקנה

סקר מקיף שפורסם בשנת 2008 באוניברסיטת אלבמה שבארה"ב מצא כי שכיחות המבוגרים הסובלים מאקנה היא:



אקנה לא רק למתבגרים



לאספירין ניתן להשתמש בפיילינג על בסיס חומצת אלפא הידרוקסית, רטינואידים או חומצה אצලאית כחלוף. יש להימנע משימוש מומם בפיילינג או משיכוש בפיילינג שאיט מותאים בריסודות לא מתאימים. כמו כן, יש להימנע משימוש בפיילינג החורש שפשור של השוער לרובמא: פילינג גוררים או פילינג גושתי, כיוון שהם עלולים לגרום לירוי יתר בשער שעשו לחממו את מטבח האקנה.

• מסיצה - מומלץ להשתמש פעמי עד פעמיים בשבוע במסכת המכללת חומרים בעלי יכולת ספיהה של החלב, לחוגמא: מסכת חומר המסוגלת לספוח את שדי החלב שעל פין השוער ובכך למנוע את העצובות של בעור הנקבובית.

• סחם או קרם טיפול - במקרים של אקנה דלקתי או אקנה פיברוזיס, מסף לשגרת הטיפול סחם או קרם טיפול המכיל חומרים בעלי מגוון פעוליות:

• חומרים אנטיבקטריאליים - בנזאיל פרוקסיד, שנן עצ התה, גופרית, פחופילים, רוזוצניל, קנספור • חומרים אנטידלקטיים - פחופילים, אבק, נאצין, ליוקואיד לבנה תה יוק

• חומרים בעלי פעילות מוגבהת - אלורה, לבנדה קומוניל, קלומודלה, תה יוק, אורוגן

• לחות - חשוב במצבי אקנה להKEEPIT על שימושם קבוע בקרם לחות קל ונוטל שום, כיוון שהוא יבש גורם לנפר לפאות על היובש באמצעות ייצור גוגבר של חלב ובקר לגראם להחזרת האקנה.

• טיפול פוטודינמי - טיפול באיכות תרפיתית או כחול יסיל לטיפוי רמות ברפיי האקנה ופיתוח לשפטו חלק מתוכנית הטיפול.

הוכנתה היא דרך מיוי לשלש AGA, P.C., יעדת מודעית, מומחית לבניות שור ונענת קליפקה לטיפול פנים ואסתטיקה בריג.



בחון מהויק של סוג האקנה והבנת הגורמים המשפיעים, חשוב יותר להציגו הפתחתה

בוחן המקרים שוגות הטיפול באקנה כלל

• יקי עדין של השוער - יש להשתמש בתכשיר יקי עדין שאינו מכיל חומרים מוגרים או דטרגנטים חזקים, אשר מנקה בעדרות את השוער מבלי ליבשו.

יש לזכור כי יקי יתר אין מונע הפרשת חלב מבולטות החלב, הרבה טוועים לחשוב שייבש השוער והפעעים עשו "לפְאָה" את האקנה. בעודו של שימושה יבש השוער גומם לשאבה הפוכה ויצור גורם לנפר לייצר יותר חלב על מנת להקל על היובש.

• פילינג - שימוש בפיילינגritis חשב מאוד בטיפול באקנה. הפילינג מכיל חומרים מקלפים המאפשרים פקוז של הנקבוביות בשוער לרובמא: 1-2% חומצה סליצילית (חוונצה ביתא הידרוקסיטו - AHA) המסוגלת לקלף בעור הנקבובית את החלב שהצטבר. כיוון שחוונצה זו שייכת למשפחת האספירין, במקרים בהם יש רישיון בחידוקים.

הטיפול באקנה דלקתי יתמקד במQUIIL בכל ארבע הגישות הטיפוליות שציין לעיל הפתחתה ייצור חלב, בוועת הצטברות החלב יחד עם תאuro בעור הנקבובית, קטילת חיידק *P. acnes* המתרכבים בדקיק השוער והרגעת הדלקת.

• אקנה פיברוזיס (Cystic acne) - נחשב לסוג הקשה ביותר למחרות שהוא גורם מואזן הסיבות כמו באקנה הקל וביבוגן.

הגורם: אקנה פיברוזיס הוא מצב בו הזיהום והדלקת מתחפשטים לשכבות העמוקות יותר בעור הנגעים הרבה יותרocabim בחשואה למגעים באקנה קל ובוגן, עם סיכון גבוה של הצלולות.

ה洽זאה: על פני השוער אקנה פיברוזיס מותבעת בגאנים ציטיים מוגבים, אוחניים,ocabim, גחלים ועמוקים יותר הדלקת, יתמקד באקנה פיבrozיס כמו באקנה דלקת, בהפתחתה יוצר חלב, מניעת הצטברות *P. acnes* הhalb בעור הנקבובית, קטילת חיידק *P. acnes* והרגעת הדלקת שנרגמה כתוצאה מהלימה בחידוקים.